

*Zjistěte vše, co je ve Vašich silách.
Udělejte vše, co je ve Vašich silách.
Zajistěte si tu nejlepší ochranu,
jakou můžete.*

www.vsecomuzu.cz

**Co jsem ochotna udělat, abych
ochránila své zdraví do budoucna?**

Vše co můžu

www.vsecomuzu.cz

Důležité informace o vakcíně SILGARD®

Vakcína SILGARD® nezabrání vzniku všech typů rakoviny děložního čípku, takže je důležité pokračovat v pravidelných gynekologických prohlídkách a vyšetřeních včetně onkologického screeningu děložního čípku.

Vakcína SILGARD® tato onemocnění nevyлéčí a neochrání před onemocněními, jež jsou způsobena jinými typy HPV.

Tak jako všechny očkovací látky, vakcína SILGARD® nemusí plně ochránit každého.

Vakcína SILGARD® může způsobit: teplotu, v místě injekce zarudnutí, bolest, otoky, krvácení, svědění a dále kopřivku a dýchací obtíže.

Nechte se včas očkovat!

Silgard® injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombinantní, adsorbovaná). Vakcína Silgard® se podává injekčně ve 3 dávkách. Tak jako všechny očkovací látky, ani vakcína Silgard® nemusí plně ochránit každého a nezabrání vzniku všech typů rakoviny děložního čípku. Očkování nenahrazuje pravidelné gynekologické prohlídky. Promluvte si s lékařem o možnosti očkování vakcínou Silgard®.

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci k léčivému přípravku.



Více informací na www.vsecomuzu.cz

SILGARD®



SILGARD®

VAKCÍNA PROTI RAKOVINĚ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
I GENITÁLNÍM BRADAVICÍM

Rozhodla jsem se udělat...

vše co můžu

Více informací na
www.vsecomuzu.cz



© Registrovaná ochranná známka Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.
© Copyright Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A., 2008. Všechna práva vyhrazena.
Merck Sharp & Dohme Idea, Inc., org.sl.*, Křenova 5, 162 00 Praha 6, tel.: 233 010 111, www.msdi.cz
* Affiliate of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

07-09-GRD-2008-CZ-1501PE



Co jsem ochotna udělat, abych ochránila svou budoucnost?

Vše co můžu

Rakovina děložního čípku: Mohla by postihnout i Vás.

Je těžké si představit, že by nemoc s tak závažnými důsledky jako rakovina děložního čípku mohla postihnout i Vás – stát se to ale může.

Rakovina děložního čípku není dědičným onemocněním, jak se někteří lidé domnívají. Je způsobena určitými typy běžného viru, zvaným lidský papilomavirus (human papillomavirus – HPV). Přestože většina infekcí HPV samovolně vymizí, může Vás HPV virus ohrozit právě nyní v mladším věku. Proto je velmi důležité pro ochranu Vaší budoucnosti udělat něco už teď.

Víte, že

- ▶ každý den zemře na rakovinu děložního čípku na celém světě více než 650 žen?

Nečekejte a udělejte všechno, co je ve Vašich silách. Promluvte si s lékařem o vakcíně, která Vám může pomoci při ochraně před rakovinou děložního čípku, genitálními bradavicemi a dalšími nemocemi způsobenými virem HPV.

Existuje souvislost mezi infekcí virem HPV, rakovinou děložního čípku a genitálními bradavicemi.

Existuje více než 100 typů HPV. Mezi nimi je 30 typů HPV, které mohou postihnout oblast genitálií – z toho některé závažným až život ohrožujícím způsobem:

- ▶ Některé typy mohou způsobit rakovinu a prekancerózu děložního čípku a zevních rodidel.
- ▶ Další typy mohou způsobit genitální bradavice.

Další fakta o HPV:

- ▶ Během života se virem HPV nakazí 8 z 10 žen
- ▶ Asi 1 z 10 lidí na celém světě (přibližně 630 milionů lidí) je nositelem viru HPV.

Jak se lidé nakazí virem HPV?

Přibližně polovina žen, u kterých byla diagnostikována rakovina děložního čípku, je ve věku 35–55 let, mnoho z nich se však virem HPV pravděpodobně nakazilo již v mladém věku.

Virem HPV se může nakazit kdokoli – jak muži, tak ženy. A protože se virus neprojevuje žádnými příznaky nebo symptomy, mnoho lidí ani neví, že jsou virem nakaženi – nebo že jej přenášejí.

Virus HPV se přenáší snadno. Může se přenést při jakékoli formě intimního styku, při které dochází ke kontaktu genitálií – tedy nejenom při pohlavním styku. Proto je velmi důležité, abyste se chránili už nyní.



Co jsem ochotna udělat, abych ochránila své touhy a sny?

Vše co můžu

Důsledky infekce virem HPV by Vás mohly provázet po celý život.

Rakovina děložního čípku. Zamyslete se, dokud je čas.

Mladé ženy ve věku od 20 do 30 let jsou citlivější na HPV, virus způsobující rakovinu děložního čípku, protože jejich tělesný vývoj ještě probíhá. Pokud je dívka nebo mladá žena vystavena viru HPV a její tělo se viru nezbaví, může se u ní později vyvinout rakovina děložního čípku. Takže zatímco je většina žen, u kterých byla diagnostikována rakovina děložního čípku, ve věku 35 až 55 let, mnohé z nich byly pravděpodobně vystaveny „vysoce rizikovému“ typu viru HPV již v mladém věku.

Pravidelným prováděním cytologických stěrů se můžete lépe chránit před zvýšeným rizikem rakoviny děložního čípku.

Silgard® – jedinečná vakcína

SILGARD® je očkovací látkou, která pomáhá chránit před onemocněními, jež jsou způsobena typy HPV 6, 11, 16 a 18. Tyto jsou příčinou více než 70 % případů rakovinu děložního čípku a 90 % případů genitálních bradavic na celém světě.

SILGARD® je jedinečnou vakcínou, která prokazatelně pomáhá chránit před onemocněními, jež způsobují typy HPV 6, 11, 16 a 18:

- ▶ **rakovina děložního čípku**
- ▶ **abnormální změny buněk děložního čípku, vagíny a zevních rodidel, jež mohou vést k rakovině**
- ▶ **genitální bradavice**

Vakcína SILGARD® je určena dětem a dospívajícím ve věku 9–15 let a dospělým ženám ve věku 16–26 let.

Očkovací schéma – 3 dávky celkem

Vakcína SILGARD® je aplikována injekčně ve 3 dávkách v průběhu 6 měsíců.

- ▶ **První dávka:** V termínu, na kterém se Vy a Váš lékař domluvíte.
- ▶ **Druhá dávka:** 2 měsíce po první dávce.
- ▶ **Třetí dávka:** 6 měsíců po první dávce.

Rozhodne-li Váš lékař, že vakcína SILGARD® je pro Vás vhodná, přínos v plné míře je dosažen po aplikaci všech 3 dávek.

Pokud je nezbytné alternativní očkovací schéma, druhá dávka musí být podána nejméně 1 měsíc po první dávce a třetí dávka musí být podána nejméně 3 měsíce po druhé dávce. Všechny tři dávky musí být podány během 1 roku.

Datum 1. dávky	Datum 2. dávky za 2 měsíce od první dávky	Datum 3. dávky za 6 měsíců od první dávky
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>